

4-1. テニルクロール関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社	性 状	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
アルハーブフロアブル	テニルクロール……4.0%	エス・ディー・エス (19784)	クミアイ化学	類白色水和性粘稠懸濁液体	4年	500ml×20本	~-4(*1)、移植時、+0~ノビエ1L
ショッカー フロアブル	ダイムロン……28.0% テニルクロール……4.0%	エス・ディー・エス (20137) エス・ディー・エス (20137)	大塚アグリテクノ (20302)	淡褐色水和性粘稠懸濁液体	4年	500ml×20本	~-4(*2)、+0~ノビエ1Lまで
スピフロアブル	テニルクロール……2.9% ペンチキサゾン……2.9%	エス・ディー・エス (21235) 科研製薬 (21234)	住友化学 (21236) 三井化学アグロ	淡褐色水和性粘稠懸濁液体	4年	500ml×20本	北海道: +0~ノビエ1Lまで 全域(北海道を除く): ~-4(*2)、+0~ノビエ1Lまで
たんぼにボンジャンボ	テニルクロール……6.7% ピラゾルスルフロンエチル……0.70% ビリブチカルブ……16.7%	エス・ディー・エス (20757) 日産化学 (20755) 日本曹達 (20758)	大塚化学 (20756)	淡褐色細粒水溶性パック入り 1パック30g	3年	300g(30g×10)×20袋	ノビエ2.5葉期まで
ワンベストフロアブル	テニルクロール……2.0% ピラゾキシフェン……15.0% プロモブチド……10.0%	エス・ディー・エス (18337) 石原産業 (18338) 住友化学	石原バイオサイエンス(18338)	類白色水和性粘稠乳懸濁液体	3年	300ml×20本 500ml×20本 1.5ℓ×6本	300~500ml/10a散布:北海道はノビエ発生前まで、全域(北海道を除く)はノビエ1葉期まで、ただし、関東・東山・東海の早期栽培地帯及び近畿・中国・四国の砂壤土ではノビエの発生始期まで。 500ml/10a散布:移植時、移植直後~ノビエ1葉期まで 1ℓ/10a散布:ノビエ2葉期まで
クサメツツLフロアブル	テニルクロール……5.0% ペンシルフロメチル……1.0%	エス・ディー・エス (18599) デュボン (18598)	日本農薬 (18597) 北興化学 (18596)	類白色水和性粘稠懸濁液体	3年	500ml×20本	ノビエ2葉期まで (北海道、東北を除く全域)
キングダムLフロアブル	テニルクロール……4.0% ビリブチカルブ……10.0% ペンシルフロメチル……1.0%	エス・ディー・エス (19813) 日本曹達 (19811) デュボン (19812)	石原バイオサイエンス(20032)	類白色水和性粘稠懸濁液体	4年	500ml×20本	ノビエ2.5葉期まで (北海道、東北を除く全域)
バピカLフロアブル	シハロホップブチル……3.6% テニルクロール……4.2% ペンシルフロメチル……1.0%	ダウ エス・ディー・エス (19824) デュボン (19823)	日本農薬 (19825)	類白色水和性粘稠懸濁液体	3年	500ml×20本	ノビエ3葉期まで (北海道、東北を除く全域)
ハビコラン粒剤	クミルロン……5.0% テニルクロール……0.7% ペンゾフェナップ……4.0%	丸紅 (19183) エス・ディー・エス バイエルクロップサイエンス	丸紅 (19183)	類白色細粒	3年	3kg×8袋	ノビエ2葉期まで (北海道、東北、北陸はノビエ1.5葉期まで)
ビシット粒剤17	シハロホップブチル……0.60% テニルクロール……0.70% ペンシルフロメチル……0.17%	ダウ エス・ディー・エス デュボン (21741)	日本農薬 (21740)	淡褐色細粒	3年	3kg×8袋	ノビエ3葉期まで (北海道、東北を除く全域)

4-2. テニルクロール関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社		性 状	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
マツタビジャンボ	クミロン……18.0% テニルクロール……3.0%	丸紅 (21921) エス・ディー・エス (21923)	日本農薬 (21922)		類白色錠形(厚さ1.8cm、 直径5cm、重量50g)	3年	500g (50g×10)×20袋	北海道:+1～ノビエ1Lまで 全域(北海道を除く): ~-4(*2)、+1～ノビエ1Lまで