

[フルセトスルフロン水和剤]

ブロードケア顆粒水和剤

有効成分：フルセトスルフロン..... 50.0%

性 状：類白色水和性細粒
 毒 性：－
 危 険 物：－
 有効年限：3年
 包 装：150g×10袋

ブロードケアは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

〔特長〕

- 幅広い殺草スペクトラムを有し、一年生及び多年生広葉雑草に対し優れた除草効果を示す。
- グリーン周りでも安心して使える。
- 芝生地と緑地の雑草防除に使える。


〔適用雑草と使用方法〕

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用方法	フルセトスル フロンを含む農薬 の総使用回数
				薬量	希釈水量			
日本芝 (こうらいしば)	－	ヒメクグ、 ハマスゲ	芝生育期 (雑草発生 初期)	0.03 ～ 0.06g/m ²	100 ～ 200 ml / m ²	3回 以内	散布	3回以内
		一年生 イネ科 雑草	春夏期 芝生育期 (雑草発生 初期)	0.045 ～ 0.06g/m ²				
日本芝		芝生育期 (雑草発生前 ～発生初期)	0.03 ～ 0.06g/m ²					
西洋芝 (ベントグラ ス)		芝生育期 (雑草発生 初期)						
西洋芝 (パーミュー ダグラス) 西洋芝 (ケンタッキ ーブルーグ ラス)		一年生及び 多年生広葉 雑草		春夏期 芝生育期 (雑草発生 初期)				
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草 生育初期	0.03 ～ 0.18g/m ²	3回 以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に雑草 茎葉散布 又は全面 土壌散布		
			雑草発生前	0.045 ～ 0.18g/m ²				
		クズ	雑草 生育初期 ～生育期	0.06 ～ 0.18g/m ²				
			雑草 生育休止期 ～萌芽期					

効果・薬害等の注意

- 本剤は雑草の発生前から生育期に有効なので、時期を失ないように均一に散布する。
- 周辺の植物にかかると薬害が生じるので、散布の際は芝生の中や付近にある草木や花木、畑作物などに薬液がかからないようその付近での散布はさける。
- 散布に用いた器具類はよく水洗いして、他の用途に使用する時は、影響のないように注意する。
- 空袋は圃場などに放置せずに適切に処理する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木類等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しない。また、樹木類等有用植物の根が分布していると思われる所では使用をさける。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意する。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
-  ●散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをする。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
 - 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
 - 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。
- [保管]：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

農薬登録(登録番号)：エス・ディー・エス バイオテック (22387)

販売：エス・ディー・エス バイオテック