〔クロルタールジメチル・デシルアルコール乳剤〕

ホワイトリボン

有効成分：クロルタールジメチル［ジメチル=テトラクロロテレフタラート］…… 0.20%
デシルアルコール（化管法1種）…… 70.0%
有機溶剤等…… 29.8%

性　　状	淡黄色澄明可乳化油状液体
毒　　性	－
危 険 物	第四類 第三石油類・水溶性
有効年限	5年
包　　装	1000㎖×12本

ホワイトリボンは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

〔特長〕

- クロルタールジメチルは、たばこわき芽の幼芽細胞に直接浸透し、細胞の有糸分裂を阻害することでわき芽伸長を抑制する。
- デシルアルコールは、脱水作用により幼芽を枯殺する。
- わき芽抑制効果により、芽かき作業の省力化が期待できる。
- 接触型のわき芽抑制剤のため、心止後の使用においては上位葉の伸長・肥大には影響がない。

〔適用病害と使用方法〕

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルタールジメチルを含む農薬の総使用回数	デシルアルコールを含む農薬の総使用回数
たばこ	わき芽抑制	30～50倍	20㎖／株	心止後	2回以内	スポット散布	2回以内	6回以内

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 本剤の所要量を所定量の水にうすめ調製し、よくかき混ぜてから速やかに散布する。
- 本剤は接触型のわき芽抑制剤なので、収穫葉に薬液が飛散しないように接触型専用ノズルを使用し、所定の濃度の薬液が幹に沿ってわき芽に十分接触するように散布する。
- すでに大きくなったわき芽（3cm以上）には十分な効果が期待できないので、心止後なるべく早い時期に所定希釈液を散布する。
- 降雨などにより散布が遅れてわき芽が伸長した場合は、大きくなったわき芽（3cm以上）を摘芽した後散布する。
- 散布直後の降雨は効果が低下するおそれがあるので、降雨が予想される場合は、散布をさける。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意する。

〔保管〕：火気や直射日光をさけ、食品と区別して、低温な場所に密栓して保管する。厳冬期には、
凝固することがあるが、融解後の成分に変化はない。
化管法に対応するその他の注意は別表の分類4に表示してある。

農薬登録（登録番号）：エス・ディー・エス バイオテック（24510）
販売：OATアグリオ