

〔BT 水和剤〕

チューンアップ顆粒水和剤

有効成分：バチルス チューリンゲンシス菌の
生芽胞及び産生結晶毒素…………… 10.0%
(力価として 1000B.m.t. 単位/mg)

性状	暗褐色水和性細粒および微粒
毒性	-
危険物	-
有効年限	4年
包装	250g×20袋 100g×50袋

チューンアップは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

〔特長〕

- 食毒として作用し、速やかに摂食阻害効果を示す。
- 殺虫タンパク質の含量が多く、安定した効果を示す。
- 水溶けや作物への付着が良い。
- 有機農産物生産や特別栽培農産物生産に使用できる。
- 人畜、魚類、鳥類に対し安全性が高い。
- ミツバチ、マルハナバチ等の有用昆虫や天敵に対する安全性が高い。
- あぶらな科野菜に対する安全性が高い。

〔適用害虫と使用方法〕




作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数
水稲	フタオビコヤガ	16倍	0.8ℓ ／10a		-	無人航空機による散布	-
	コブノメイガイ イネツトムシ	2000～4000倍	60～150ℓ ／10a				
	ニカメイチュウ	1000～2000倍					
野菜類 (トマト、ミニトマトを除く)	アオムシ コナガ オオタバコガ ハイマダラノメイガ	2000～3000倍		発生初期 但し、 収穫前日まで	-	散布	-
	ヨトウムシ	2000倍					
	ウリノメイガ	3000倍					
トマト ミニトマト	アオムシ コナガ オオタバコガ ハイマダラノメイガ	2000～3000倍	100～300ℓ ／10a		-	散布	-
	ヨトウムシ トマトキバガ	2000倍					
	ウリノメイガ	3000倍					
ストック なたね	コナガ	2000倍 2000～4000倍		発生初期			
果樹類 (りんご、かんきつを除く)	ハマキムシ類 ケムシ類	4000倍	200～700ℓ ／10a	発生初期 但し、 収穫前日まで			
樹木類	ケムシ類			発生初期			

作物名	適害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬総使用回数
りんご	ハマキムシ類 シャクトリムシ類	4000倍	200～700ℓ ／10a	発生初期 但し、 収穫前日 まで	—	散布	—
	ケムシ類	2000～4000倍					
かんきつ	ハマキムシ類 ケムシ類	4000倍	200～400ℓ ／10a	発生初期 但し、 摘採前日 まで	—	散布	—
	アゲハ類	2000～4000倍					
茶	チャハマキ チャノコカクモンハマキ チャノホソガ ヨモギエダシャク	2000倍	200～400ℓ ／10a	発生初期 但し、 摘採前日 まで	—	散布	—

効果・薬害等の注意

- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布する。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
- 使用に当っては展着剤を加用することが望ましい。
- アルカリ性の強い、石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬及びアルカリ性の強い葉面施用の肥料などとの混用はさける。
- 本剤は若令幼虫に有効なので、若令幼虫期に時期を失わずに散布する。
- 本剤は吸湿すると固化したり、効果が低下したりすることがあるので、貯蔵に当っては湿気に注意し、特に使用残りの薬剤は密封して乾燥した冷暗所に貯蔵する。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守る。
 - 散布は散布機種種の散布基準に従って実施する。
 - 散布に当っては散布機種種に適合した散布装置を使用する。
 - 散布中、薬液の漏れないように機体の散布配管その他の散布装置の十分な点検を行う。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意

-  ●蚕に対する毒性があるので、養蚕主要県その他主要養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では施用しない。またこれら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからない様に風向等に十分注意して散布する。なお本剤の使用に当っては散布区域の使用規制に従う。
-  ●散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換する。
 - 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
-  ●かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさける。
 - 夏期高温時の使用をさける。
 - 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
 - 空袋は圃場などに放置せず適切に処理する。

〔保管〕：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

農業登録(登録番号): エス・ディー・エス バイオテック (20479)、アグロ カネショウ (23943)

販売: アグロ カネショウ